Für das **Vorgehen** bei **Bienenstichen** ist zu unterscheiden:

- Allergische Sofortreaktionen (nach 5 15 Minuten) Bei Kindern selten.
 - Im Falle von Atemnot (Asthma) oder Blutdruckabfall mit evtl. Bewusstlosigkeit
 - ➤ ist die Ambulanz (Schweiz 144) bzw. der Notarztwagen (EU 112) zu rufen und
 - → falls zur Hand, Adrenalin (Epipen Autoinjetor) spritzen.

Verdacht auf lebensgefährliche Allergie, siehe unten

Elternwissen.

- □ Im Falle von Hautausschlag am Körper ausserhalb der Stichstelle mit Quaddeln (Nesselfieber = Urticaria, Foto am Ende der Datei <u>hier</u>)
 - ist eine Ärztin / ein Arzt in den Folgetagen zu konsultieren.

- Im Moment keine Gefahr, aber es ist abzuklären ob eine Allergie vorliegt, zwecks Abgabe von Notfallmedikamenten wie Epipen bei einem späteren Stich. (Elternwissen).
- Allgemeine Giftwirkung Bienenstich (beginnt nach 1 - 2 Stunden):

Kind < 2 Jahre ab 10 Bienenstiche ► Überwachung im Spital.

Kind 2 - 5 Jahre ab 30 Bienenstiche ► Überwachung im Spital.

Kind 5 - 10 Jahre ab 50 Bienenstiche ► Überwachung im Spital.

Eine Biene kann beim Stich mehr Gift als eine Hornisse und wesentlich mehr als eine Wespe entladen.

■ Lokale Giftreaktion bei Stichen am Hals und im Mund (beginnt nach 1 - 2 Stunden).

Stiche am Hals und im Mund kön-

Stiche am Hals und im Mund können zu einer Schwellung des Kehl

Tag der Feststellung zu konsultieren.

Hat eine junge Katze den Kratzer zugefügt, ist eine Katzenkratzkrankheit möglich.

Elternwissen

85% bis 90% der Bisse erfolgen durch Hunde, 5% bis 10% durch Katzen, 2% bis 5% durch Meerschweinchen und andere Nager, 2% bis 3% durch Menschen.

Bei Menschenbissen z.T. passiv beim Schlag gegen den Mund, aktiv auch bei Spitzen – Fussballspielern und Boxern, können Rötung, Schwellung, eitriger Ausfluss und Schmerzen je nach Erreger bereits nach 12 Stunden, bei Capnocytophaga canimorsus aber auch erst nach 5 – 8 Tagen auftreten, und Streuen der Bakterien über das Blut (Sepsis, von Laien fälschlich "Blutvergiftung" genannt) 2 Tage später.